



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2020/0272/MRA/ ES/APP(NA)-2017-18-00449**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 12.05.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă paralelă eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: Ungaria
- Nr. Autorizației din statul membru emitent: **ES/APP(NA)-2017-18-00449**

II. Data emiterii autorizației: 19.06.2020, rescris în data de 14.07.2020

III. Data expirării autorizației: 29.08.2022

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: MAGNUM GEL GANDACI

Alte denumiri comerciale: MAGNUM GEL ROACHES, ECOGEL GANDACI DE BUCATARIE, ECOGEL ROACHES, MAGNUM GEL GANDACI DE BUCATARIE.

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: MYLVA S.A.

Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Spania.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: MYLVA S.A.

Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Spania.

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: MYLVA S.A

Adresa producătorului: Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Spania.

Adresa loc producție: C/Sant Galderic, 23 Poligono, Sant Pol de Mar, Industrial Ponent

NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA: Bayer Crop Science AG

Adresa producătorului : Industrial Operations, Alfred Nobel, Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania

Adresa loc producție: Alte Heerstr, D-41538 Dormagen, Germania

VI.

TIPUL DE PRODUS TP18 – Insecticid, acaricid sau produse pentru controlul altor artropode

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: public general, profesional, profesional instruit

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE**

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Capcană din plastic cu 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 g de momeală în gel

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1)Substanta activă


a) *substante chimice*

Denumirea IUPAC	Imidacloprid ((2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine)
Numar CAS	138261-41-3
Numar CE	428-040-8
Continut de substanță activă	2.150

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Pictograme, simboluri, și indicarea pericolului	 GHS09
Fraze de risc H	EUH 208 – Conține 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-ona și 2-octil-1, 2-tiazol-3-ona-. Poate provoca o reacție alergică H411: Toxic pentru mediu acvatic cu efecte cu termen lung.
Fraze de prudență P	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103: Cititi eticheta înainte de utilizare. P273: Evitati dispersarea in mediu. P391: Colectați scurgerile de produs. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/instrucțiunilor de pe etichetă

XI. AMBALAREA

- Seringi din plastic LDPE cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame
- Cartușe din plastic LDPE cu 15, 20, 25, 30, 35, 40 și 50 g.

XII.

INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Utilizare 1 – Interior, găuri și adâncituri - Momeală în gel aplicată sub formă de picături - Public în general (neprofesional)

Domeniul de utilizare: Interior, găuri și adâncituri.

Metoda (metodele) de aplicare: Aplicare directă cu seringi sub formă de picături.

Aplicați produsul biocid doar în găuri și adâncituri, în spatele mobilelor și mașinilor. Produsul nu se poate utiliza pe suprafețe.

Nu amestecați cu alte produse chimice sau în zone tratate recent cu alt insecticid.

Nu aplicați pe lemn sau suprafețe poroase.

Evitați contactul cu suprafețele tratate.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**


Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**VIII.****TIPUL PREPARATULUI:** Capcană din plastic cu 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 g de momeală în gel**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1)Substanta activă****a) substante chimice**

Denumirea IUPAC	Imidacloprid ((2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine)
Numar CAS	138261-41-3
Numar CE	428-040-8
Continut de substanță activă	2.150

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - substante chimice**

Pictograme, simboluri, și indicarea pericolului	 GHS09
Fraze de risc H	EUH 208 – Conține 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-ona și 2-octil-1, 2-tiazol-3-ona-. Poate provoca o reacție alergică H411: Toxic pentru mediu acvatic cu efecte cu termen lung.
Fraze de prudență P	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103: Cititi eticheta înainte de utilizare. P273: Evitati dispersarea in mediu. P391: Colectați scurgerile de produs. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/instrucțiunilor de pe etichetă

XI. AMBALAREA

- Seringi din plastic LDPE cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame
- Cartușe din plastic LDPE cu 15, 20, 25, 30, 35, 40 și 50 g.

XII.**INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE****Utilizare 1 – Interior, găuri și adâncituri - Momeală în gel aplicată sub formă de picături - Public în general (neprofesional)**

Domeniul de utilizare: Interior, găuri și adâncituri.

Metoda (metodele) de aplicare: Aplicare directă cu seringi sub formă de picături.

Aplicați produsul biocid doar în găuri și adâncituri, în spatele mobilelor și mașinilor. Produsul nu se poate utiliza pe suprafețe.

Nu amestecați cu alte produse chimice sau în zone tratate recent cu alt insecticid.

Nu aplicați pe lemn sau suprafețe poroase.

Evitați contactul cu suprafețele tratate.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Nu expuneți picăturile de momeală la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură (De ex.: calorifer).

Doza (dozele) și frecvența de aplicare:

Doza: în funcție de gradul de infestare și de specia de gândaci (1 picătură = 0,04 g).

Gândacul german (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m² (3-4 picături/m²)

Gândacul oriental (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 picături/m²)

Gândacul american (*Periplaneta americana*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 picături/m²)

Frecvența aplicării: 1 aplicare la fiecare 4 săptămâni. Aplicați din nou, dacă infestarea persistă. Nu aplicați mai mult de 12 picături la o casă și la o aplicare.

Frecvența tratării: la 3 luni după dispariția infestării puteți aplica tratamentul din nou.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Seringi din plastic LDPE cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame.

Utilizare 2 – Interior, găuri și adâncituri – Momeală în gel aplicată sub formă de picături – Personal profesional.

Domeniul de utilizare: Interior, găuri și adâncituri.

Metoda (metodele) de aplicare: Aplicare directă cu seringi sub formă de picături.

Aplicați produsul biocid doar în găuri și adâncituri, în spatele mobilelor și mașinilor. Produsul nu se poate utiliza pe suprafețe.

Nu amestecați cu alte produse chimice sau în zone tratate recent cu alt insecticid.

Nu aplicați pe lemn sau suprafețe poroase.

Evitați contactul cu suprafețele tratate.

Nu expuneți picăturile de momeală la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură (De ex.: calorifer).

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Doza: în funcție de gradul de infestare și de specia de gândaci (1 picătură = 0,04 g).

Gândacul german (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m² (3-4 picături/m²)

Gândacul oriental (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 picături/m²)

Gândacul american (*Periplaneta americana*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 picături/m²)

Frecvența aplicării: 1 aplicare la fiecare 4 săptămâni. Aplicați din nou, dacă infestarea persistă. Nu aplicați mai mult de 12 picături la o casă și la o aplicare.

Frecvența tratării: la 3 luni după dispariția infestării puteți aplica tratamentul din nou.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Seringi din plastic LDPE cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame.

Utilizare 3 – Interior, găuri și adâncituri – Momeală în gel aplicată sub formă de picături – Personal profesional specializat.

Domeniul de utilizare: Interior, găuri și adâncituri.

Metoda (metodele) de aplicare: Aplicare directă cu seringi sub formă de picături.

Aplicați produsul biocid doar în găuri și adâncituri, în spatele mobilelor și mașinilor. Produsul nu se poate utiliza pe suprafețe.

Nu amestecați cu alte produse chimice sau în zone tratate recent cu alt insecticid.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Nu aplicați pe lemn sau suprafețe poroase.

Evitați contactul cu suprafețele tratate.

Nu expuneți picăturile de momeală la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură (De ex.: calorifer).

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Doza: în funcție de gradul de infestare și de specia de gândaci (1 picătură = 0,04 g).

Gândacul german (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m² (3-4 picături/m²)

Gândacul oriental (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 picături/m²)

Gândacul american (*Periplaneta americana*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 picături/m²)

Frecvența aplicării: 1 aplicare la fiecare 4 săptămâni. Aplicați din nou, dacă infestarea persistă. Nu aplicați mai mult de 12 picături la o casă și la o aplicare.

Frecvența tratării: la 3 luni după dispariția infestării puteți aplica tratamentul din nou.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Seringi din plastic LDPE cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 g.

Cartușe din plastic LDPE cu 15, 20, 25, 30, 35, 40 și 50 g.

XIII. CONDIȚIILE DE DEPOZITARE:

A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Se păstrează momeala în ambalajul original, închis la loc uscat, răcoros și bine ventilat. Se recomandă păstrarea produsului de preferat la o temperatură între 5°C și 45°C.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDIȚII NORMALE DE DEPOZITARE ALTE INFORMAȚII: 2 ani în condiții normale.

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim, Gabriela Cîlinca

